

TRATAMENTO DA HEPATITE C

A Exxentia Grupo Fitoterapêutico, S.A. com sede na Espanha desenvolveu particular tecnologia na produção de extratos vegetais.

Esta tecnologia confere aos seus extratos características próprias que o tornam eficazes. Há inclusive absoluto controle de todas as fases do processo: origem, extração e controles físicos químicos.

Investindo em pesquisa com alto grau tecnológico desenvolveram alguns extratos vegetais diferenciados, tais como: **HEPATIC-Agrimoni (AE)® e HEPATIC-Lami (LA)®**, extratos vegetais especiais da Agrimonia Eupatória e do Laminum Álbum.

O vírus da Hepatite C tem aumentando de maneira importante. Este vírus é responsável na maioria dos casos de Hepatite crônica nos Estados Unidos, que pode conduzir a Cirrose Hepática, câncer primário do fígado. A descompensação hepática é a maior causa de transplantes de fígado daquele país.

Calcula-se a população mundial de infectados pelo vírus (HVC) da Hepatite C em 170 milhões de pacientes.

Somente nos Estados Unidos, aproximadamente 4 milhões de pessoas são infectadas, a cada ano, com o vírus da Hepatite C (HVC). Esta doença é responsável por (8.000 a 10.000) mortes anualmente naquele país.

Através dos tempos surgiram inúmeras terapias, entretanto existem variáveis que modificam as respostas dos enfermos tratados, tais como: idade, sexo, tempo da doença, níveis de enzimas hepáticas ALT, carga viral, tipos de vírus. Esses critérios permitiram definir a porcentagem de resposta, tempo de tratamento e prognóstico.

HEPATIC-Agrimoni (AE)® e HEPATIC-Lami (LA)® usados conjuntamente auxiliam no tratamento da HEPATITE C reduzindo a carga viral, vem juntar-se ao arsenal terapêutico existente no mercado.

TESTES REALIZADOS

HEPATIC-Agrimoni (AE)[®] e HEPATIC-Lami (LA)[®]

Tem se documentado testes realizados em pessoas com quadro de Hepatite C, diagnosticados por médicos com apoio de exames de laboratórios e, que tomaram HEPATIC-Agrimoni (AE)[®] e HEPATIC-Lami (LA)[®] durante 4 a 6 semanas os quais alcançaram uma evolução sintomatológica favorável.

As pesquisas realizadas com HEPATIC-Agrimoni (AE)[®] e HEPATIC-Lami (LA)[®] mostram que no princípio do tratamento, 100% dos pacientes melhoraram suas manifestações clínicas, diminuindo o cansaço, dores articulares e pruridos, e permitiu melhora do sono.

A resposta clínica foi excelente na melhoria de qualidade de vida destes pacientes.

As cargas virais diminuíram e não voltaram a se elevar.

Em relação a resposta bioquímica, de 14 pacientes estudados, obteve-se 85% de melhora das enzimas hepáticas ALT e AST e 15% não melhorou ALT, portanto 100% melhorou a AST. Devemos destacar as variações que ocorreram com as transaminases, similar ao que pode ocorrer com as terapias tradicionais. Como resultado: 6 pacientes, do total de 14 tratados, normalizaram os valores de ALT e AST ao final de 45 dias de tratamento.

Em 100% dos pacientes, houve redução total dos sintomas da hepatite C, normalização dos níveis de transaminases e bilirrubina e, baixa drástica da carga viral. E isto em 3 meses de tratamento monitorado.

Doses

A associação tem efeito sinérgico com 55mg de HEPATIC-Agrimoni (AE)[®] e de 55mg de HEPATIC-Lami (LA)[®], 3 vezes ao dia, de 15 a 30 minutos antes das refeições, com intervalos de 6 horas entre a ingestão dos extratos.

Efeitos colaterais

Dos pacientes tratados: 7% dos casos reclamaram de dores nas pernas e 7% reclamaram de cefaléia durante os primeiros 15 dias de tratamento, porém estes sintomas desapareceram durante o tratamento.

HEPATIC-Agrimoni (AE)[®] e HEPATIC-Lami (LA)[®]

A associação dos extratos de acordo com os resultados de provas: de cultivos celulares; citotoxicidade; toxicidade geral; teratogenesis e sua confirmação para citometria e, para testes in vivo em laboratório, em doses superiores ao que está autorizado ao consumo humano, **não foi identificado provas de risco potencial e efeitos secundários de seu consumo.**

Se isto é comparado com o tratamento tradicional - os efeitos secundários são responsáveis, em um bom número de casos de abandono do tratamento e, de custos elevados para o paciente que não é capaz a aderir com certa frequência.

Referências Bibliográficas

1. **REYNA, JUAN SALAZAR;** *Conclusões de Resultados e do protocolo, em obtido que o ensaio clínico* Faculdade Medicina da Universidade Autônoma de Tamaulipas, U.A.T. 1998/2000
2. **FONG, Harry HS;** Conhecimento Atual e Prospectos de Hepacition (HP-57) como uma Anti-hepatite o Agente Virótico. Pharmacognosy University de Illinois Chicago, E.U.A. 2006
3. **REYNA, Dr. JUAN SALAZAR, CANO, Dr. ERNESTO CHANES AUTONOMOUS.** *PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL COM "HP57"* Universidade Autônoma de Tamaulipas.
4. **RESTITUYO, PLUTARCO;** *Tratamiento con Hepacition em pacts com Hepapitis C Crônica no respondedores de Interferon Pegilado y Ribavirina,* Centro Gastrodiagnóstico e Especialidades São Domingo.



TELE VENDAS
0800 704 8303
vendas@embrafarma.com.br



SAT - Serviço de Apoio Técnico
(11) 2165 9259
sat@embrafarma.com.br